

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Anschutz P., Hyacinthe C., Carbonel P., Jouanneau J.M., et Jorissen F.J. 1999. La distribution du phosphore inorganique dans les sédiments modernes du Golfe de Gascogne. *C. R. Acad. Sci.*, Paris 328, pp 765-771.
- Blanc G., Lapaquellerie Y., Maillet N., et Anschutz P. 1999. A Cadmium budget for the Lot-Garonne fluvial system (France). *Hydrobiologia* 410, pp 331-341.
- Burdloff D., Gasparini S., Sautour B., Etcheber H., Castel J. 2000. Is the copepod egg production in a highly turbid estuary (the Gironde, France) a function of the biochemical composition of seston ? *Aquatic Ecology*, 34 pp 165-175.
- Castaing P., Froidefond J-M., Lazure P., Weber O., Prudhomme R., Jouanneau J-M. 1999. Relationship between hydrology and seasonal distribution of suspended sediments on the continental shelf of the Bay of Biscay. *Deep Sea Res.* 46 (10), pp 1979-2001.
- Froidefond J.M., Lavender S., Herblan A., Laborde P. and H. Dupuis, 1998. SeaWiFS data interpretation in relationship with in situ measurements in a coastal area. *Oceans'98*, IEEE Conference, Nice, 28 Sept.- 1 oct 1998. Proceedings: 4p.
- Froidefond, J-M. P. Laborde, S. Lavender, et A. Herblan, 2000. Quantification des particules en suspension des eaux côtières à l'ouest de la gironde à partir des données satellites seawifs. VIIème Colloque International d'Océanographie du Golfe de Gascogne. Biarritz, 4-6 avril 2000.
- Gohin F., Druon J.-N., Lampert L. A five channel chlorophyll algorithm applied to SeaWiFS data processed by SeaDAS in coastal waters. *Int. J. Remote Sensing*. Soumis.
- Gonzalez J. L.,C. Labry, C. Dange, A. Herblan, D. Delmas et B. Boutier, 2000. Rôle du compartiment phytoplanctonique sur le cycle du Cadmium en zone littorale : utilisation de traceurs radioactifs (14C, 33P, 109Cd) dans des expériences d'incubation quasi-in situ. VIIème Colloque International d'Océanographie du Golfe de Gascogne. Biarritz, 4-6 avril 2000.
- Herblan A., Delmas D., Sautour B., Artigas F. 1998. Phytoplankton spring bloom of the Gironde plume waters in the Bay of Biscay : early phosphorus limitation and food-web consequences. *Oceanol. Acta*, 21 (2), pp 279-291.
- Hyacinthe C., Anschutz P., Carbonel P., Jouanneau J.M., et Jorissen F.J. 2000. Early diagenetic processes in the muddy sediments of the Bay of Biscay. *Mar. Geol.* Sous presse.
- Koutsikopoulos C., Le Cann B. 1996. Physical processes and hydrological structures related to the Bay of Biscay anchovy. *Sci. Mar.*, 60 (2), pp 9-19.
- Labry C., D. Delmas, A. Herblan, P. Laborde, 2000. Phosphorus limitation of winter/spring phytoplankton blooms within the gironde plume in the bay of biscay. Communication au VIIème Colloque International d'Océanographie du Golfe de Gascogne. Biarritz, 4-6 avril 2000.
- Lazure P., Jegou A-M. 1998. 3D modelling of seasonal evolution of Loire and Gironde plumes on Biscay Bay continental shelf. *Oceanol. Acta*, 21 (2), pp 165-177.
- Le Corre P., L'Helguen S. 1993. Nitrogen source for uptake by Gyrodinium cf. aureolum in a tidal front. *Limnol. Oceanogr.*, 38 (2), pp 446-451.
- Le Corre, P., Wafar, M.V.M., L'Helguen, S. & Maguer, J.F. 1996. Ammonium assimilation and regeneration by size-fractionated plankton in permanently well-mixed temperate waters. *J. Plankt. Res.*, 18, pp 355-370.
- L'Helguen, S., Morin, P., Le Corre, P., Salaün, C., Le Fèvre, J., Le Tureau, J.Y. & Mazé, R., 1993. Frontal ecosystems : physical control of the carbon and nitrogen fluxes. *Ann. Inst. Océanogr.*, 69, pp 95-99.
- Maguer, J.F., L'Helguen, S., Madec, C. & Le Corre, P. 1999. Seasonal patterns of ammonium regeneration from size-fractionated microheterotrophs. *Contin. Shelf Res.*, 19, pp 1755-1770.
- Michel P., Boutier B., Herblan A., Averyt B., Artigas F., Auger D. 1998. Behaviour of arsenic on the continental shelf off the Gironde Estuary : role of phytoplankton in vertical fluxes during spring bloom conditions. *Oceanol. Acta*, 21 (2), pp 325-333.
- Morin P., Le Corre P., Marty Y., L'Helguen S. 1991. Evolution printanière des éléments nutritifs et du phytoplancton sur le plateau continental armoricain (Europe du Nord-Ouest). *Oceanol. Acta*, 14 (3), pp 263-279.

- Morin, P., Wafar, M.V.M., & Le Corre, P., 1993. Estimation of nitrate flux in a tidal front from satellite-derived temperature data. *J. Geophys. Res.*, 98, pp 4689-4695.
- Sauriau P-G., Guillaud J-F., Thouvenin B. 1996. Estuaire de la Loire : qualité des eaux. Rapport de synthèse de l'APEEL (Ass. pour la protection de l'estuaire de la Loire, Nantes). Vol. 2, 104p.
- Sautour B., Artigas F., Herblan A., Laborde P. 1996. Zooplankton grazing impact in the plume of dilution of the Gironde estuary prior to the spring bloom. *J. Plankton Res.* 8 (5), pp 835-853.
- Sautour B., Artigas L. F., Delmas D., Herblan A., Laborde P. 2000. Grazing impact of micro- and mesozooplankton during a spring situation in coastal waters off the Gironde estuary. *J. Plankton Res.* 22 (3), pp 531-552.
- Varela M. 1996. Phytoplankton ecology in the Bay of Biscay. *Sci. Mar.*, 60 (2), pp 45-53.