

## **REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES :**

Blanchet-Aurigny A., Dubois S., Hily, C., Rochette S., Le Goaster E., Guillou M. (soumis). Cascading effects of long-term changes in two co-occurring ophiuroids populations.

Dutertre M., Hamon D., Chevalier, C., Ehrhold A. (acceptée avec révisions). Natural abiotic factors determining soft-bottom macrofaunal distribution in the seabed habitats of South Brittany. ICES Journal of Marine Science.

Nguyen H.G, Fablet R., Ehrhold A., Boucher J.M. (2011). Keypoint-based analysis of sonar images: application to seabed recognition. Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, 99 : 1-14.

Ehrhold A., Hamon D., Chevalier C., Autret E., Houlgatte E., Gaffet J.D., Caisey X., Cordier C., Dutertre M., Alix A.S., Navon M., Kerdoncuff J., Gentil F., Thiebaut E (2011). Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région Bretagne. Approche sectorielle subtidale : Identification et caractérisation des habitats benthiques du secteur Morlaix. RST/IFREMER/DYNECO/Ecologie benthique/11-03/REBENT.

Rollet Claire, Loarer Ronan, Bonnot-Courtois Chantal, Hamon Nolwenn (2011). Réseau de surveillance benthique - Région Bretagne - Approche sectorielle intertidale : cartographie des habitats benthiques - Secteur des Abers. <http://archimer.ifremer.fr/doc/00056/16756/>

Ehrhold A., Hamon D., Guillaumont B. (2006). The REBENT monitoring network, a spatially integrated, acoustic approach to surveying nearshore macrobenthic habitats: application to the Bay of Concarneau (South Brittany, France). ICES Journal of Marine Science, 63: 1604-1615.

Ehrhold A., Hamon D., Chevalier C., Gaffet J.D., Caisey X., Blanchet A., Alix A.S. (2010). Réseau de surveillance benthique (REBENT) – Région Bretagne. Approche sectorielle subtidale : Identification et caractérisation des habitats benthiques du secteur Quiberon. RST/IFREMER/DYNECO/Ecologie benthique/10-03/REBENT, 76 p. + 8 annexes.